

WARUNKI UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU, ZACHOWANIA INTEGRALNOŚCI OBSZARU ORAZ SPÓJNOŚCI SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp.	Przedmiot ochrony	Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Zatoka Pucka PLB220005, zachowania integralności Obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci Natura 2000
Warunki odnoszące się do innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000		
1	Wszystkie gatunki ptaków będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005	- Na terenach pokrywających się z granicami rezerwatów przyrody „Beka”, „Mechelińskie Łąki” i „Słone Łąki” oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w mocy pozostają bardziej restrykcyjne zakazy wynikające z ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do tych obszarów, co bezpośrednio sprzyja ochronie populacji ptaków w ostoi. - Utrzymanie właściwego stanu ochrony ptaków zależy od zachowania ekosystemów morskich i lądowych, które są chronione w ramach w/w form ochrony przyrody oraz obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.
2	A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A050 <i>Mareca penelope</i> (c, w) A051 <i>Mareca strepera</i> (w) A052 <i>Anas crecca</i> (c) A053 <i>Anas platyrhynchos</i> (w) A056 <i>Anas clypeata</i> (c) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w)	Utrzymanie właściwego stanu ochrony ptaków roślinożernych, w szczególności łabędzi, obejmuje przestrzeganie zakazu niszczenia podwodnych łąk zosterowych, stanowiących ich kluczową bazę pokarmową.
3	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c)	- Utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunków lęgowych plaż, łąk zalewowych i słonorośli oraz migrujących ptaków siewkowych obejmuje ochronę nadmorskich solnisk i kicziny znajdujących się w granicach rezerwatów przyrody, stanowiących miejsca lęgowe i żerowiska tych gatunków. - Warunkiem zachowania siedlisk ptaków siewkowych i wodno-błotnych jest kontynuowanie ekstensywnego wypasu bydła i koni oraz kontrolowane koszenie trzcinowisk, co zapobiega sukcesji wtórnej zarastania łąk w granicach rezerwatów przyrody i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

	A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A608 <i>Motacilla citreola</i> (r)	
4	Wszystkie gatunki ptaków niełęgowych (populacje migrujące – c oraz zimujące – w) będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005	Zatoka Pucka pełni rolę kluczowego węzła w transeuropejskich korytarzach migracyjnych ptaków. Ochrona tego obszaru w powiązaniu z innymi formami ochrony chroni te szlaki przed fragmentacją. Warunkiem zachowania spójności sieci jest bezwzględne ograniczenie zabudowy oraz powstrzymanie lokalizacji farm wiatrowych czy innych wysokich konstrukcji technicznych w strefie brzegowej i na wodach Zatoki, które mogłyby stanowić bariery dla przelotów ptaków lub powodować ich śmiertelność.
Warunki odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania		
5	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A070 <i>Mergus merganser</i> (r) A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c)	1. Niewprowadzanie nowych zmian w przeznaczeniu terenów dla nowego zainwestowania, w tym zabudowy; niezwiększanie/nieintensyfikowanie istniejących wskaźników zagospodarowania terenu w obowiązujących planach miejscowych, w szczególności – niezwiększanie intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy i niezmnieszanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej zapisanych w tych dokumentach. 2. Nielokalizowanie nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem infrastruktury technicznej (w tym tymczasowych, również nie związanych trwale z gruntem, z wyjątkiem obiektów małej architektury drewnianej) w strefie o szerokości 200 m od linii brzegu Zatoki Puckiej, a w przypadku istniejącej zabudowy nieprzybliżanie linii zabudowy do linii brzegu. 3. Kontrola obecnego zagospodarowania, w szczególności badanie legalności istniejących obiektów (domków rekreacyjnych, tymczasowych obiektów usługowych, pomostów, itp.) i w konsekwencji niedopuszczanie do ich legalizacji oraz dążenie do likwidacji nielegalnego zagospodarowania i przywrócenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem - monitorowanie działalności rekreacyjnej w szczególności w sezonie turystycznym. 4. Dla nowych terenów inwestycyjnych, nieobjętych dotychczas miejscowymi planami, a planowanych do zabudowy, wskazanie wskaźników zagospodarowania gwarantujących ekstensywną zabudowę i niewielkie przekształcenia powierzchni ziemi, tj. niski % powierzchni zabudowy (nie więcej niż 10-15%) i wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (nie mniej niż 80%). 5. Objęcie planami miejscowymi terenów, które dotychczas ich nie posiadają, w szczególności obszarów podlegających silnej sezonowo presji inwestycyjnej.

	A177 <i>Larus minutus</i> (c) A184 <i>Larus argentatus</i> (r) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (r) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	6. Nielokalizowanie nowych zorganizowanych kąpielisk, miejsc przeznaczonych do kąpeli, pomostów oraz innych obiektów i urządzeń służących rekreacji i wypoczynkowi w strefie brzegu Zatoki Puckiej, w terenach nieprzeznaczonych dotychczas na ten cel.
6	A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w) A046 <i>Branta bernicla</i> (c)	Uwzględnianie w warunkach lokalizacyjnych i technicznych farm fotowoltaicznych w otoczeniu obszaru zjawiska tzw. „efektu jeziora” poprzez stosowanie powłok antyrefleksyjnych, unikanie lokalizacji instalacji na trasach przelotów ptaków między noclegowiskiem a żerowiskami oraz stosowanie rozwiązań ograniczających percepcję powierzchni paneli jako zbiornika wodnego.
7	A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w) A046 <i>Branta bernicla</i> (c) A070 <i>Mergus merganser</i> (r) A127 <i>Grus grus</i> (c, w)	Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów rolniczych i leśnych, w tym ochrona zadrzewień śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych.
8	Wszystkie gatunki ptaków będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005	W dokumentach, gdzie nie został uwzględniony obszar Natura 2000 i istnienie chronionych siedlisk wskazana jest konieczność ich uwzględnienia w zmianie planu i zapisanie dla nich zasad ochrony.

9	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cephus grylle</i> (w)	Za przedsięwzięcia mogące stwarzać ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, wymagające każdorazowo szczegółowej analizy, w tym w razie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, uznaje się w szczególności: 1) budowę, rozbudowę i modernizację portów, przystani, marin, pomostów i falochronów w granicach obszaru oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym inwestycje wielkoskalowe w portach w Gdańsku i Gdyni (m.in. terminal FSRU, Port Zewnętrzny w Gdyni, rozbudowa terminali paliwowych i kontenerowych); 2) roboty czerpalne i refulacyjne (bagrowanie torów podejściowych, pogłębianie akwenów portowych, tworzenie kłapowisk) prowadzone w okresie lęgowym, migracyjnym lub zimowania kluczowych gatunków, lub w rejonach o wysokim znaczeniu żerowiskowym; 3) budowę podmorskiej infrastruktury liniowej (gazociągi, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) przebiegającej przez obszar lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym planowane gazociągi wysokiego ciśnienia pod dnem Zatoki Puckiej;
10	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A070 <i>Mergus merganser</i> (r) A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r)	Za przedsięwzięcia mogące stwarzać ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, wymagające każdorazowo szczegółowej analizy, w tym w razie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, uznaje się w szczególności: 1) budowę, rozbudowę i modernizację portów, przystani, marin, pomostów i falochronów w granicach obszaru oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym inwestycje wielkoskalowe w portach w Gdańsku i Gdyni (m.in. terminal FSRU, Port Zewnętrzny w Gdyni, rozbudowa terminali paliwowych i kontenerowych); 2) roboty czerpalne i refulacyjne (bagrowanie torów podejściowych, pogłębianie akwenów portowych, tworzenie kłapowisk) prowadzone w okresie lęgowym, migracyjnym lub zimowania kluczowych gatunków, lub w rejonach o wysokim znaczeniu żerowiskowym;

	A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w) A182 <i>Larus canus</i> (c, w) A184 <i>Larus argentatus</i> (r) A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w) A187 <i>Larus marinus</i> (c, w) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (r) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	3) zabudowę rekreacyjną, mieszkaniową i usługową (w tym pola namiotowe i kempingowe) w strefie brzegowej i jej bezpośrednim sąsiedztwie, prowadzącą do dalszej urbanizacji linii brzegowej i utraty naturalnych siedlisk strefy styku woda-ląd; 4) umacnianie brzegu (budowa nowych opasek, falochronów brzegowych) na odcinkach dotychczas naturalnych lub półnaturalnych, prowadzące do trwałej utraty plaż, płyczn i naturalnej strefy przyboju;
11	A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w) A046 <i>Branta bernicla</i> (c) A127 <i>Grus grus</i> (c, w)	Za przedsięwzięcia mogące stwarzać ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, wymagające każdorazowo szczegółowej analizy, w tym w razie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, uznaje się w szczególności: 1) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł – elektrowni wiatrowych oraz wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych – w promieniu do 10 km od granicy obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem tras przelotów ptaków między obszarem a żerowiskami polnymi;

12	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A608 <i>Motacilla citreola</i> (r)	Za przedsięwzięcia mogące stwarzać ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, wymagające każdorazowo szczegółowej analizy, w tym w razie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, uznaje się w szczególności: 1) zaniechanie tradycyjnego użytkowania kośnego lub pastwiskowego łąk nadmorskich, prowadzące do sukcesji roślinności szuwarowej i zaniku siedlisk lęgowych gatunków łąk zalewowych i słonoroślowych; 2) działania odwadniające i regulacyjne w obrębie rezerwatów przyrody „Beka”, „Słone Łąki”, „Mechelińskie Łąki” i użytku ekologicznych Torfowe Kłyle oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, ograniczające naturalne zalewy słonowodne;
13	Wszystkie gatunki ptaków będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005	Za przedsięwzięcia mogące stwarzać ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, wymagające każdorazowo szczegółowej analizy, w tym w razie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, uznaje się w szczególności: 1) wprowadzanie i rozprzestrzenianie obcych gatunków inwazyjnych mogących zmieniać strukturę bazy pokarmowej ptaków wodnych (w tym gatunków ryb i bezkręgowców wodnych). Dla wszystkich kategorii przedsięwzięć wymienionych w punktach 9–13 zaleca się: 1) każdorazową analizę możliwości kumulacji oddziaływań z innymi, już istniejącymi lub planowanymi przedsięwzięciami w granicach i w otoczeniu obszaru; 2) odnoszenie przewidywanych oddziaływań do konkretnych wskaźników stanu ochrony siedlisk zdefiniowanych dla poszczególnych grup ekologicznych ptaków, jako podstawy obiektywizacji oceny istotności oddziaływania; 3) stosowanie – jako standardu minimalnego – środków minimalizujących analogicznych do już zastosowanych w decyzjach środowiskowych wydanych dla inwestycji w obszarze (sezonowość prac, nadzór ornitologiczny, strefy buforowe, zasady odkładania urobku); 4) uwzględnianie w ocenach oddziaływania powiązania funkcjonalnego obszaru Zatoka Pucka PLB220005 z obszarem Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz jego roli jako elementu bałtyckiej sieci zimowisk i korytarzy migracyjnych ptaków wodno-błotnych, w celu zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci Natura 2000.
Warunki odnoszące się do zagospodarowania obszarów morskich		
14	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w)	Żegluga i ruch jednostek pływających: 1) wprowadzenie stref ograniczonej prędkości i/lub okresowego ograniczenia ruchu jednostek motorowych w rejonach o szczególnym znaczeniu dla koncentracji ptaków: Ryf Mew, Cypel Rewski, Rybitwia Mielizna, ujście Redy, a w okresie lęgowym (marzec–lipiec) także w sąsiedztwie kolonii lęgowych rybitw i mew;

A043	<i>Anser anser</i> (c, w)	
A045	<i>Branta leucopsis</i> (c, w)	
A046	<i>Branta bernicla</i> (c)	
A048	<i>Tadorna tadorna</i> (r)	
A048	<i>Tadorna tadorna</i> (c)	
A070	<i>Mergus merganser</i> (r)	
A075	<i>Haliaeetus albicilla</i> (w)	
A130	<i>Haematopus ostralegus</i> (r)	
A130	<i>Haematopus ostralegus</i> (c)	
A137	<i>Charadrius hiaticula</i> (r)	
A137	<i>Charadrius hiaticula</i> (c)	
A143	<i>Calidris canutus</i> (c)	
A144	<i>Calidris alba</i> (c)	
A145	<i>Calidris minuta</i> (c)	
A147	<i>Calidris ferruginea</i> (c)	
A149	<i>Calidris alpina</i> (c)	
A150	<i>Limicola falcinellus</i> (c)	
A157	<i>Limosa lapponica</i> (c)	
A160	<i>Numenius arquata</i> (c)	
A177	<i>Larus minutus</i> (c)	
A179	<i>Larus ridibundus</i> (c, w)	
A182	<i>Larus canus</i> (c, w)	
A184	<i>Larus argentatus</i> (r)	
A184	<i>Larus argentatus</i> (c, w)	
A187	<i>Larus marinus</i> (c, w)	
A191	<i>Sterna sandvicensis</i> (r)	
A191	<i>Sterna sandvicensis</i> (c)	
A193	<i>Sterna hirundo</i> (r)	
A193	<i>Sterna hirundo</i> (c)	
A195	<i>Sternula albifrons</i> (r)	
A197	<i>Chlidonias niger</i> (c)	

15	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A050 <i>Mareca penelope</i> (c, w) A051 <i>Mareca strepera</i> (w) A052 <i>Anas crecca</i> (c) A053 <i>Anas platyrhynchos</i> (w) A056 <i>Anas clypeata</i> (c) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	Żegluga i ruch jednostek pływających: 1) uwzględnianie w warunkach lokalizacyjnych nowych sezonowych połączeń pasażerskich (na wzór linii Puck–Chałupy uruchomionej w 2026 r.) wymogu prowadzenia tras poza obszarami koncentracji ptaków na wodzie oraz stosowania niskoemisyjnych i cichych jednostek (np. napędu elektrycznego) w rejonach o najwyższej wrażliwości;
----	---	--

16	Wszystkie gatunki ptaków będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005	Żegluga i ruch jednostek pływających: 1) odnoszenie natężenia ruchu rekreacyjnego (motorowodnego i żeglarskiego) do progów wskaźników presji rekreacyjnej zdefiniowanych dla poszczególnych grup ptaków przy wydawaniu zgód na organizację imprez sportowych i regat na akwenie;
17	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cephus grylle</i> (w)	Żegluga i ruch jednostek pływających: 1) monitorowanie łącznego (skumulowanego) wzrostu natężenia ruchu statków, odnotowanego już między 2019 a 2023 rokiem w związku z rozwojem portów w Gdańsku i Gdyni, jako czynnika mogącego przesuwac wartości wskaźników presji żeglugowej w kierunku oceny niezadowolającej lub złej.
18	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r)	Roboty czerpalne i zagospodarowanie urobku czerpalnego: 1) prowadzenie robót czerpalnych i refulacyjnych poza okresem lęgowym oraz poza szczytem migracji i zimowania kluczowych gatunków – wzorem rozwiązania zastosowanego w decyzji środowiskowej dla falochronu osłonowego terminala FSRU (RDOŚ-Gd-WOO.420.80.2023.KB.13), która wyłączyła prace czerpalne z okresu migracji i zimowania uhli i łodówki oraz ograniczyła odkładanie urobku na plażach objętych ochroną; 2) prowadzenie prac czerpalnych i refulacyjnych pod nadzorem ornitologicznym, z obowiązkiem przerywania prac w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla lęgów lub dużych koncentracji ptaków;

A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c)	
A059 <i>Aythya ferina</i> (w)	
A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w)	
A062 <i>Aythya marila</i> (c, w)	
A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w)	
A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w)	
A065 <i>Melanitta nigra</i> (w)	
A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w)	
A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w)	
A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w)	
A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w)	
A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w)	
A125 <i>Fulica atra</i> (c, w)	
A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r)	
A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c)	
A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r)	
A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c)	
A143 <i>Calidris canutus</i> (c)	
A144 <i>Calidris alba</i> (c)	
A145 <i>Calidris minuta</i> (c)	
A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c)	
A149 <i>Calidris alpina</i> (c)	
A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c)	
A157 <i>Limosa lapponica</i> (c)	
A160 <i>Numenius arquata</i> (c)	
A177 <i>Larus minutus</i> (c)	
A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c)	
A193 <i>Sterna hirundo</i> (c)	
A195 <i>Sternula albifrons</i> (r)	
A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	
A199 <i>Uria aalge</i> (w)	
A200 <i>Alca torda</i> (w)	
A202 <i>Cephus grylle</i> (w)	

19	A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w)	Roboty czerpalne i zagospodarowanie urobku czerpalnego: 1) lokalizowanie nowych kładowisk poza rejonami o największym znaczeniu żerowiskowym dla bentofagów nurkujących;
20	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r)	Roboty czerpalne i zagospodarowanie urobku czerpalnego: 1) wykorzystywanie urobku czerpalnego w pierwszej kolejności do refulacji plaż w sposób zachowujący naturalne elementy strefy przyboju (kidzinę, drobne zatoczki, nierówności terenu), a nie prowadzący do ujednolicenia morfologii brzegu;
21	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w) A182 <i>Larus canus</i> (c, w) A184 <i>Larus argentatus</i> (r) A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w) A187 <i>Larus marinus</i> (c, w) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (r) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	Roboty czerpalne i zagospodarowanie urobku czerpalnego: 1) utrzymywanie stref buforowych wokół kluczowych miejsc odpoczynku i lęgów sztucznych (np. minimalnej odległości 150 m jednostek pływających od „ptasiej platformy” na Falochronie Wyspowym w Porcie Gdańsk) jako standardu stosowanego również dla analogicznych, nowo planowanych przedsięwzięć.

22	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A070 <i>Mergus merganser</i> (r) A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A184 <i>Larus argentatus</i> (r) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (r) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	Lokalizacja obiektów na morzu (porty, przystanie, mariny, infrastruktura liniowa, urządzenia OZE) 1) lokalizowanie nowych przystani i marin wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel w obowiązujących opracowaniach planistycznych; 2) ograniczanie maksymalnej liczby miejsc postojowych w nowo wyznaczanych podakwenach o funkcji marina (Sm) do wielkości niepowodujących przekroczenia progów wskaźników presji rekreacyjnej w danym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc odpoczynku dużych koncentracji ptaków;
23	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w)	Lokalizacja obiektów na morzu (porty, przystanie, mariny, infrastruktura liniowa, urządzenia OZE) 1) prowadzenie rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia) z zachowaniem stref buforowych wokół elementów infrastruktury pełniących funkcję zastępczych siedlisk lęgowych (np. „ptasia platforma” na Falochronie Wyspowym) oraz z uwzględnieniem warunków minimalizujących wypracowanych dla dotychczasowych decyzji środowiskowych (sezonowość prac, nadzór ornitologiczny, ograniczenia dotyczące miejsc odkładania urobku);

	A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A184 <i>Larus argentatus</i> (r) A193 <i>Sterna hirundo</i> (r) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cephus grylle</i> (w)	
24	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A199 <i>Uria aalge</i> (w)	Lokalizacja obiektów na morzu (porty, przystanie, mariny, infrastruktura liniowa, urządzenia OZE) 1) trasowanie nowej podmorskiej infrastruktury liniowej (kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, gazociągi) poza rejonami o największym zagęszczeniu żerowisk bentosowych, z prowadzeniem prac instalacyjnych poza okresem migracji i zimowania kluczowych gatunków nurkujących;

	A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	
25	A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w) A046 <i>Branta bernicla</i> (c) A127 <i>Grus grus</i> (c, w)	Lokalizacja obiektów na morzu (porty, przystanie, mariny, infrastruktura liniowa, urządzenia OZE) 1) lokalizowanie morskich urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł poza granicami obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka oraz poddawanie szczególnej analizie ornitologicznej wszelkich przedsięwzięć tego typu planowanych w promieniu do 10 km od granicy obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem tras dobowych przelotów łabędzi i gęsi między noclegowiskiem na wodach Zatoki a żerowiskami polnymi poza jej granicami.
Warunki odnoszące się do gospodarowania wodami		
26	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A608 <i>Motacilla citreola</i> (r)	1. Utrzymanie lub przywrócenie możliwości naturalnego, okresowego zalewania wodami morskimi terenów słonorośli w obrębie rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” oraz innych nizin nadmorskich, w tym rozważenie – w porozumieniu z zarządcami wałów przeciwsztormowych i systemów melioracyjnych – lokalnych rozwiązań przywracających drożność hydrauliczną między zatoką a wnętrzem obniżeń terenowych, bez naruszania funkcji przeciwpowodziowej tych urządzeń. 2. Prowadzenie konserwacji sieci rowów melioracyjnych na nizinach nadmorskich w sposób ograniczony do niezbędnego minimum technicznego, z unikaniem pogłębiania lub intensyfikacji odwodnienia w sąsiedztwie stwierdzonych siedlisk lęgowych gatunków łąk zalewowych i słonoroślowych, a w szczególności w obrębie płątów siedliska pliszki cytrynowej.
27	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w)	Ograniczanie dopływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych do wód Zatoki Puckiej, w tym zrzutów z oczyszczalni ścieków obsługujących aglomerację trójmiejską oraz miejscowości nadmorskie, a także spływów powierzchniowych z terenów rolniczych zlewni Redy i Płutnicy, celem ograniczenia eutrofizacji i utrzymania jakości wód sprzyjającej rozwojowi podwodnych łąk roślinności naczyniowej stanowiących bazę pokarmową ptaków roślinożernych.

A046 <i>Branta bernicla</i> (c)	
A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c)	
A050 <i>Mareca penelope</i> (c, w)	
A051 <i>Mareca strepera</i> (w)	
A052 <i>Anas crecca</i> (c)	
A053 <i>Anas platyrhynchos</i> (w)	
A056 <i>Anas clypeata</i> (c)	
A059 <i>Aythya ferina</i> (w)	
A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w)	
A062 <i>Aythya marila</i> (c, w)	
A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w)	
A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w)	
A065 <i>Melanitta nigra</i> (w)	
A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w)	
A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w)	
A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w)	
A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w)	
A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w)	
A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w)	
A125 <i>Fulica atra</i> (c, w)	
A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c)	
A160 <i>Numenius arquata</i> (c)	
A177 <i>Larus minutus</i> (c)	
A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w)	
A182 <i>Larus canus</i> (c, w)	
A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w)	
A187 <i>Larus marinus</i> (c, w)	
A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	
A199 <i>Uria aalge</i> (w)	
A200 <i>Alca torda</i> (w)	
A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	

28	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A608 <i>Motacilla citreola</i> (r)	1. Uwzględnianie w gospodarce wodnej prognozowanego wzrostu średniego poziomu morza (rzędu 2–4 mm rocznie) oraz rosnącej częstości epizodów sztormowych jako czynników zwiększających ryzyko podtopień i erozji na nizinach nadmorskich, w tym planowanie działań adaptacyjnych (np. w ramach przyszłego Programu Ochrony Brzegów Morskich 2026–2040) z uwzględnieniem potrzeb siedliskowych ptaków strefy brzegowej, a nie wyłącznie ochrony infrastruktury. 2. Monitorowanie wpływu wzrostu poziomu wód gruntowych i powierzchniowych na zasięg i jakość siedlisk słonoroślowych, jako podstawy do ewentualnej korekty zasad gospodarowania wodami na kolejnych etapach realizacji planu ochrony.
Warunki odnoszące się do gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej		
29	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r) A608 <i>Motacilla citreola</i> (r)	Gospodarka rolna: 1) utrzymanie ekstensywnego użytkowania kośnego lub pastwiskowego łąk przybrzeżnych przylegających do wód Zatoki Puckiej, w szczególności w otoczeniu rezerwatów przyrody „Beka”, „Mechelińskie Łąki” i „Słone Łąki”, jako warunku koniecznego dla zachowania siedlisk lęgowych ohara, ostrygojada, sieweczki obrożnej i pliszki cytrynowej oraz ograniczenia nadmiernej ekspansji trzcinowisk kosztem muraw; 2) dążenie do przywrócenia wypasu lub koszenia na łąkach, na których zaprzestano tego użytkowania, w ramach dostępnych mechanizmów wsparcia rolno-środowiskowego;
30	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus</i>	Gospodarka rolna: 1) ograniczanie intensyfikacji produkcji rolnej (w tym zmiany użytków zielonych na grunty orne, nadmiernego nawożenia) na terenach przyległych do obszaru, mogącej zwiększać spływ biogenów do wód Zatoki i przyspieszać eutrofizację;

	<i>bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w) A046 <i>Branta bernicla</i> (c) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A050 <i>Mareca penelope</i> (c, w) A051 <i>Mareca strepera</i> (w) A052 <i>Anas crecca</i> (c) A053 <i>Anas platyrhynchos</i> (w) A056 <i>Anas clypeata</i> (c) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w) A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i> (c) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w) A182 <i>Larus canus</i> (c, w) A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w) A187 <i>Larus marinus</i> (c, w) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	
--	--	--

31	A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w) A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w) A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w) A041 <i>Anser albifrons</i> (w) A043 <i>Anser anser</i> (c, w) A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w) A046 <i>Branta bernicla</i> (c) A127 <i>Grus grus</i> (c, w)	Gospodarka rolna: 1) unikanie stosowania celowych metod płoszenia ptaków (w tym urządzeń akustycznych typu armatki hukowe) na polach w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru w okresie jesienno-zimowym, kiedy pola te pełnią funkcję uzupełniających żerowisk dla łabędzi i gęsi korzystających z wód zatoki jako noclegowiska; w przypadku konieczności ochrony upraw zaleca się stosowanie metod selektywnych czasowo i przestrzennie oraz uzgadnianie terminów z lokalnym monitoringiem ornitologicznym.
32	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A070 <i>Mergus merganser</i> (r)	Gospodarka leśna 1) zachowanie istniejących płatów starodrzewu i zadrzewień nadwodnych o znaczeniu jako miejsca lęgowe i noclegowe czapli siwej i kormorana oraz jako siedliska lęgowe nurogęsi;
33	A028 <i>Ardea cinerea</i> (r)	Gospodarka leśna 1) prowadzenie zabiegów gospodarki leśnej w sąsiedztwie obszaru w sposób uwzględniający okres lęgowy ptaków kolonijnych gniazdujących na drzewach, z unikaniem wycinki w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych kolonii lęgowych w okresie marzec–lipiec;
34	A070 <i>Mergus merganser</i> (r) A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w)	Gospodarka leśna 1) utrzymanie ciągłości pasów leśnych i zadrzewień wzdłuż brzegów Zatoki jako elementu wskaźnika stanu ochrony siedliska lęgowego nurogęsi oraz jako potencjalnych punktów obserwacyjnych i miejsc odpoczynku bielika.
35	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A059 <i>Aythya ferina</i> (w) A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w) A062 <i>Aythya marila</i> (c, w) A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w) A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w) A065 <i>Melanitta nigra</i> (w)	Gospodarka rybicka 1) prowadzenie połowów w sposób ograniczający przyłów ptaków nurkujących, w tym stosowanie narzędzi połowowych o ograniczonym ryzyku przyłowu w rejonach i okresach szczególnego zagęszczenia ptaków nurkujących, tj. w Zatoce Puckiej Wewnętrznej oraz wzdłuż zatokowych brzegów Półwyspu Helskiego, w okresie jesienno-zimowym (wrzesień–kwiecień), kiedy koncentracje ptaków nurkujących są największe; 2) prowadzenie systematycznego monitoringu przyłowu ptaków, gatunkowego i przestrzennego, umożliwiającego wyliczenie wartości referencyjnych (R _{max} , średnia liczebność populacji) niezbędnych do oceny wskaźnika „przyłów w sieci rybackie” względem progów BLT i PBR zdefiniowanych w metodyce oceny stanu ochrony; 3) promowanie i, w miarę możliwości prawnych, wspieranie wdrażania narzędzi połowowych i modyfikacji technicznych (np. oznaczników akustycznych sieci, ograniczeń głębokości stawiania sieci) ograniczających przyłów ptaków nurkujących, zgodnie z dobrymi praktykami stosowanymi w innych częściach Bałtyku; 4) ograniczanie pozostawiania w wodzie i na brzegu porzuconego sprzętu połowowego („sieci widma”, żyłek, linek), stanowiącego zagrożenie zaplątania dla ptaków wodnych.

	A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w) A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A125 <i>Fulica atra</i> (c, w) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	
36	A001 <i>Gavia stellata</i> (w) A002 <i>Gavia arctica</i> (w) A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w) A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w) A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w) A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w) A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (r) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w) A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w) A070 <i>Mergus merganser</i> (r) A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c) A193 <i>Sterna hirundo</i> (r) A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A195 <i>Sternula albifrons</i> (r) A199 <i>Uria aalge</i> (w) A200 <i>Alca torda</i> (w) A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	Gospodarka rybacka 1) uwzględnianie w planach gospodarki rybackiej sezonowości występowania ichtiofagów nurkujących i pelagicznych, w tym okresu zimowania (grudzień–luty) o największym zagęszczeniu populacji nura rdzawoszyjowego, nura czarnoszyjowego, alki, nurzyka i nurnika; 2) prowadzenie monitoringu zmian liczby jednostek połowowych i struktury połowów jako elementu oceny presji rybackiej na bazę pokarmową ichtiofagów, z uwzględnieniem obserwowanych zmian w zbiorowisku ichtiofauny (spadek sukcesu rekrutacji śledzia i storni, wzrost udziału gatunków oportunistycznych);
37	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A028 <i>Ardea cinerea</i> (w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w) A177 <i>Larus minutus</i> (c) A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c)	Gospodarka rybacka 1) utrzymanie tradycyjnych portów i przystani rybackich (Kuźnica, Rewa, Osłonino, Swarzewo) w sposób niepowodujący dalszego przekształcania naturalnej strefy brzegowej ponad istniejący stan zainwestowania;

	A193 <i>Sterna hirundo</i> (c) A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	
Warunki odnoszące się do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych		
		Nie dotyczy