

WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

Lp.	Przedmiot ochrony	Typ popu- lacji	Obecny stan/Referencyjny stan				Wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony	Cel ochrony
			Popu- lacja	Siedli- sko	Szanse zacho- wania	Ogólna ocena		
Gatunki lęgowe								
1	A028 Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>	r	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV: populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) powierzchnia drzewostanów w wieku > 40 lat o powierzchni powyżej 1 ha: ocena FV – obecnych >3 płątów potencjalnego siedliska, b) powierzchnia potencjalnych żerowisk w odległości do 20 km od kolonii: ocena FV - obecnych >500 ha żerowisk. Szanse zachowania: ocena FV: brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 210-230 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecnych >3 płątów drzewostanów w wieku > 40 lat o powierzchni powyżej 1 ha (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecnych >500 ha żerowisk położonych w odległości do 20 km od kolonii (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

2	A048 Ohar <i>Tadorna tadorna</i>	r	U1/U1	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV: populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) strefa brzegowa z naturalnymi elementami strefy przyboju granicząca z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydrami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m: ocena FV - >30% długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do lipca: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV: brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1 Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 13-15 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) >30% długości strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju graniczy z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydrami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
3	A070 Nurogęś <i>Mergus merganser</i>	r	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) siedlisko lęgowe (miejsca gniazdowania oraz wychowu piskląt) w obrębie odcinków o długości 5 km: ocena FV - > 50% odcinków monitoringowych o naturalnym ukształtowaniu strefy brzegowej i przyboju z obecnością	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 40 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) > 50% odcinków monitoringowych o naturalnym ukształtowaniu strefy

							licznych dojrzałych płatów lasów lub zadrzewień zwłaszcza graniczących bezpośrednio z linią brzegową na > 50% długości odcinka monitoringowego, b) presja rekreacyjna od marca do lipca: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	brzegowej i przyboju z obecnością licznych dojrzałych płatów lasów lub zadrzewień zwłaszcza graniczących bezpośrednio z linią brzegową na > 50% długości odcinka monitoringowego (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
4	A130 Ostrygojad <i>Haematopus ostralegus</i>	r	U2/U1	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV: populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) strefa brzegowa z naturalnymi elementami strefy przyboju granicząca z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydhami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m: ocena FV - >30% długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do lipca: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV: brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1 pary (poprawa oceny parametru z U2 na U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) >30% długości strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju graniczy z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydhami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1).

							w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1)
5	A137 Sieweczka obrożna <i>Charadrius hiaticula</i>	r	U1/U1	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV: populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) strefa brzegowa z naturalnymi elementami strefy przyboju granicząca z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydrami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m: ocena FV - >30% długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do lipca: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV: brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 2-5 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) >30% długości strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju graniczy z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydrami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).

6	A184 Mewa srebrzysta <i>Larus argentatus</i>	r	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) miejsca gniazdowania: ocena FV - obecność >2 hektarów siedlisk naturalnych (piaszczystych łach i wysp) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochny, sztuczne wyspy) niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 140-240 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) siedliska naturalne (piaszczyste łachy i wyspy) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochny, sztuczne wyspy) będące miejscem odpoczynku ptaków, niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania zajmują >2 hektary powierzchni. Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV)
7	A191 Rybitwa czubata <i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i>	r	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) miejsca gniazdowania: ocena FV - obecność >2 hektarów siedlisk naturalnych (piaszczystych łach i wysp) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochny, sztuczne wyspy) niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 470-850 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) siedliska naturalne (piaszczyste łachy i wyspy) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochny, sztuczne wyspy) będące miejscem odpoczynku ptaków, niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	wody, by nie były zalewane podczas falowania zajmują >2 hektary powierzchni. Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
8	A193 Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	r	FV	FV	FV	FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) miejsca gniazdowania: ocena FV - obecność >2 hektarów siedlisk naturalnych (piaszczystych łach i wysp) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochrony, sztuczne wyspy) niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 55-420 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) siedliska naturalne (piaszczyste łachy i wyspy) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochrony, sztuczne wyspy) będące miejscem odpoczynku ptaków, niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania zajmują >2 hektary powierzchni. Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
9	A195 Rybitwa białoczelna <i>Sternula (Sterna) albifrons</i>	r	U2/FV	U2/FV	U2/FV	U2/FV	Populacja: ocena FV: populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) strefa brzegowa z naturalnymi elementami strefy przyboju granicząca z zalewowymi łakami i pastwiskami lub wydzmami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m:	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na FV. Populacja: przywrócenie lęgów gatunków w obszarze. Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) >30% długości strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju

							ocena FV - >30% długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do lipca: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV: brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	graniczy z zalewowymi łąkami i pastwiskami lub wydrami porośniętymi roślinnością trawiastą na długości minimum 500 m (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: gatunek przestał gniazdować w obszarze. Po wdrożeniu działań mających na celu stworzenie siedlisk zastępczych przywrócenie gatunku i zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U2 na FV).
10	A608 Pliszka cytrynowa <i>Motacilla citreola</i>	r	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) obecność mozaiki trwałych użytków zielonych oraz nieużytkowanych każdego roku terenów okresowo zalewanych lub podtapianych morskimi lub rzecznyymi wodami wezbraniowymi: ocena FV - >100 ha (jeden zwarty płat lub kompleks płatów o powierzchni min. 10 ha każdy), b) użytkowanie rolnicze siedliska (kośne lub pastwiskowe) przy czym koszenie nie może odbywać się wcześniej niż w sierpniu: ocena FV - >60% powierzchni siedliska użytkowana rolniczo. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 9-15 par (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) mozaika trwałych użytków zielonych oraz nieużytkowanych każdego roku terenów okresowo zalewanych lub podtapianych morskimi lub rzecznyymi wodami wezbraniowymi zajmuje >100 ha tworząc jeden zwarty płat lub kompleks płatów o powierzchni min. 10 ha każdy (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >60% powierzchni siedliska jest użytkowana rolniczo (kośne lub pastwiskowo) przy czym koszenie odbywa

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	się nie wcześniej niż w sierpniu (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
Gatunki niełęgowe korzystające z wód Zatoki Puckiej jako noclegowiska i/lub żerowiska								
11	A036 Łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością, b) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1600-2900 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
12	A036 Łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 4400-8400 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym:

							presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
13	A037 Łabędź czarnodzioby <i>Cygnus columbianus</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 15-20 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

14	A037 Łabędź czarnodzioby <i>Cygnus columbianus</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: c) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, d) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 8-10 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: c) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), d) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
15	A038 Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: e) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, f) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 170-320 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: e) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), f) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m

							Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
16	A038 Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: g) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, h) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1400-2020 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: g) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), h) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
17	A041 Gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 290-2150 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym:

							presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania armatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem armatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania armatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
18	A043 Gęgawa <i>Anser anser</i>	c	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania armatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem armatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1330-4000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania armatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV).

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
19	A043 Gęgawa <i>Anser anser</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania amatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem amatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 2150-3000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania amatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
20	A045 Bernikla białolica <i>Branta leucopsis</i>	c	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 550-1000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

							presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania amatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem amatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania amatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
21	A045 Bernikla białolica <i>Branta leucopsis</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania amatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem amatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 300-600 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania amatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV).

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
22	A046 Bernikla obrożna <i>Branta bernicla</i>	c	XX/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania amatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem amatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 25-50 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania amatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
23	A127 Żuraw <i>Grus grus</i>	c	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 780-2250 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

							presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania amatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem amatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania amatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
24	A127 Żuraw <i>Grus grus</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) presja rekreacyjna od sierpnia do kwietnia w miejscu nocowania i/lub żerowania na wodzie: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych, b) obecność żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączonych z polowań lub stosowania amatek hukowych: ocena FV - >50% powierzchni żerowisk bez płoszenia podczas polowań lub z użyciem amatek hukowych; Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 690-1630 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >50% powierzchni żerowisk (wielkołanowe pola kukurydzy lub zbóż ozimych) wyłączone są z polowań lub stosowania amatek hukowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV).

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
Pozostałe gatunki nielęgowe								
25	A001 Nur rdzawoszyi <i>Gavia stellata</i>	w	FV/FV	U2/U1	U1/FV	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 100-135 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV).
26	A002 Nur czarnoszyi <i>Gavia arctica</i>	w	FV/FV	U2/U1	U1/FV	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 190-340 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

							poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV).
27	A005 Perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku;	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1100-2200 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1).

							zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
28	A005 Perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1700-3500 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
29	A006 Perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT),	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 50-160 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym:

							b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
30	A007 Perkoz rogaty <i>Podiceps auritus</i>	c	FV/FV	U2/U1	U1/FV	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 30-40 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV).

31	A007 Perkoz rogaty <i>Podiceps auritus</i>	w	FV/FV	U2/U1	U1/FV	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 190-540 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV).
32	A008 Zausznik <i>Podiceps nigricollis</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 10-50 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR)

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	(utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV).
33	A017 Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	c	FV/U1	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 4700-7000 osobników (pogorszenie oceny parametru z FV na U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).

34	A017 Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 4200-6500 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przytów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
35	A028 Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) obecność lasu lub zadrzewień / zakrzewień na terenach podmokłych, głównie łożowisk, o powierzchni minimum 1 ha: ocena FV - ≥ 3 potencjalnych miejsc odpoczynku i/lub noclegowisk, b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 60-170 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecnych jest ≥ 3 potencjalnych miejsc odpoczynku i/lub noclegowisk o powierzchni minimum 1 ha (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV),

							brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
36	A048 Ohar <i>Tadorna tadorna</i>	c	XX/FV	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 60-80 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).

37	A050 Świstun <i>Mareca (Anas) penelope</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością, b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 3300-6600 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
38	A050 Świstun <i>Mareca (Anas) penelope</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością, b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 470-770 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) presja rekreacyjna całoroczna: Niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów

							Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
39	A051 Krakwa <i>Mareca (Anas) strepera</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością, b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 50-90 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) presja rekreacyjna całoroczna: Niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
40	A052 Cyraneczka <i>Anas crecca</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością,	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 700-1130 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym:

							b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
41	A053 Krzyżówka <i>Anas platyrhynchos</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością, b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 6000-12300 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) presja rekreacyjna całoroczna: Niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

42	A056 Płaskonos <i>Anas clypeata</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) stopień pokrycia dna przez roślinność podwodną (makroflora) na transektach monitoringowych o szerokości 10 m: ocena FV - > 50% dna pokrytego roślinnością, b) presja rekreacyjna całoroczna: ocena FV – niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 180-350 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) > 50% dna na transektach monitoringowych o szerokości 10 m pokrywa roślinność podwodna (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
43	A059 Głowienka <i>Aythya ferina</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 420-1000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1),

							(≤10%) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek (≤10%) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
44	A061 Czernica <i>Aythya fuligula</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek (≤10%) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 9400-20500 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek (≤10%) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV),

							Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
45	A061 Czernica <i>Aythya fuligula</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 23300-36000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1).

								Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
46	A062 Ogorzałka <i>Aythya marila</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 8000-19000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

47	A062 Ogorzałka <i>Aythya marila</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 7000-10800 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
48	A063 Edredon <i>Somateria mollissima</i>	c	U1/U1	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 40-210 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).

							poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
49	A063 Edredon <i>Somateria mollissima</i>	w	U2/U2	U2/U1	U2/U2	U2/U2	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT),	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U2. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 480-1170 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U2). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym:

							b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: Zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat będzie bardzo trudne - populacja wykazuje silny spadek (utrzymanie oceny parametru na poziomie U2).
50	A064 Lodówka <i>Clangula hyemalis</i>	c	U1/U1	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 7300-12000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1),

							(≤10%) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek (≤10%) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
51	A064 Lodówka <i>Clangula hyemalis</i>	w	U1/U1	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek (≤10%) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 24500-40000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek (≤10%) względem

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
52	A065 Markaczka <i>Melanitta nigra</i>	w	FV	U1	FV	U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1000-2800 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przytów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50%

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
53	A066 Uhla <i>Melanitta fusca</i>	c	U1/U1	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1800-4000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym

								oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
54	A066 Uhla <i>Melanitta fusca</i>	w	FV	U1	FV	U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: d) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), e) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, f) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 17200-24000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: d) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), e) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), f) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

55	A067 Gągoł <i>Bucephala clangula</i>	c	FV	U1	FV	U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 3400-5300 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przytów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
56	A067 Gągoł <i>Bucephala clangula</i>	w	FV	U1	FV	U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 13300-17000 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

							poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
57	A068 Bielaczek <i>Mergus (Mergellus) albellus</i>	c	XX/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 40-110 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR)

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	(utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
58	A068 Bielaczek <i>Mergus (Mergellus) albellus</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 810-2100 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

59	A069 Szlachar <i>Mergus serrator</i>	c	XX/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 310-470 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
60	A069 Szlachar <i>Mergus serrator</i>	w	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 840-1550 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR)

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	(utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
61	A070 Nurogęś <i>Mergus merganser</i>	c	U2/U1	U1/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 400-600 osobników (poprawa oceny parametru z U2 na U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).

62	A070 Nurogęś <i>Mergus merganser</i>	w	XX/U1	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 2200-5100 osobników (poprawa oceny parametru z XX na U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
63	A075 Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	w	XX/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) wielkość bazy pokarmowej: ocena FV - średnia wartość ważonego indeksu dostępności pokarmu powyżej 80% poziomu referencyjnego wynoszącego 1,538*,	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 10-50 osobników (poprawa oceny parametru z XX na U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) średnia wartość ważonego indeksu dostępności pokarmu wyższa niż 80%

							b) udział strefy brzegowej zajętej przez lasy lub tereny otwarte ze skupiskami drzew lub pojedynczymi starymi drzewami, pozbawionej zabudowy: ocena FV - >30% strefy brzegowej. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne	poziomu referencyjnego wynoszącego 1,538* (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) >30% strefy brzegowej zajęta jest przez lasy lub tereny otwarte ze skupiskami drzew lub pojedynczymi starymi drzewami, pozbawiona zabudowy (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
64	A125 Łyska <i>Fulica atra</i>	c	FV	U1	FV	U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 10500-15100 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50%

							przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
65	A125 Łyska <i>Fulica atra</i>	w	FV	U1	FV	U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przyłów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od września do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 12100-17300 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przyłów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) średnia biomasa ($g \cdot m^{-2}$) makrozoobentosu na wszystkich stacjach badawczych: ocena FV - wzrost, stabilizacja lub niewielki spadek ($\leq 10\%$) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) presja rekreacyjna całoroczna: niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

66	A130 Ostrygojad <i>Haematopus ostralegus</i>	c	U1/U1	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 3-6 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
67	A137 Sieweczka obrożna <i>Charadrius hiaticula</i>	c	FV/FV	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 40-100 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
68	A143 Biegus rdzawy <i>Calidris canutus</i>	c	FV/FV	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 40-140 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).

69	A144 Piaskowiec <i>Calidris alba</i>	c	FV/FV	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 80-210 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
70	A145 Biegus malutki <i>Calidris minuta</i>	c	U1/U1	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 10-25 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
71	A147 Biegus krzywodzioby <i>Calidris ferruginea</i>	c	U1/U1	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 40-80 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).

72	A149 Biegus zmienny <i>Calidris alpina</i>	c	U1/U1	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 370-700 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
73	A150 Biegus płaskodzioby <i>Limicola falcinellus</i>	c	XX/FV	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 10-20 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości

							rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
74	A157 Szlamnik <i>Limosa lapponica</i>	c	XX/FV	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 30-80 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).

75	A160 Kulik wielki <i>Numenius arquata</i>	c	XX/U1	U2/U1	U2/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział strefy brzegowej z naturalnymi elementami strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki): ocena FV - $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej, b) presja rekreacyjna od marca do listopada: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na $>50\%$ punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 5-20 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) naturalne elementy strefy przyboju (kidzina, płytkie oczka wodne, drobne zatoczki) zachowały się na $\geq 30\%$ długości strefy brzegowej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
76	A177 Mewa mała <i>Hydrocoloeus (Larus) minutus</i>	c	XX/FV	U1/FV	U1/FV	U1/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV – obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U1 na FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 640-3000 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U1 na FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępne dla

							kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) średnia biomasa larw owadów wodnych (głównie z rodziny <i>Chironomidae</i>) na stacjach monitoringu: ocena FV - rosnący, stabilny lub niewielki spadek (< 20%) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od maja do września: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) średnia biomasa larw owadów wodnych (głównie z rodziny <i>Chironomidae</i>) na stacjach monitoringu rosnąca, stabilna lub wykazująca niewielki spadek (< 20%) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV).
77	A179 Śmieszka <i>Chroicocephalus</i> (<i>Larus</i>) <i>ridibundus</i>	c	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne),	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 3300-4100 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane

							płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV)
78	A179 Śmieszka <i>Chroicocephalus</i> (<i>Larus</i>) <i>ridibundus</i>	w	U1/FV	FV/FV	U1/FV	U1/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U1 na FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 4300-5200 osobników (poprawa oceny parametru z U1 na FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze,

							najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV)
79	A182 Mewa siwa <i>Larus canus</i>	c	U1/U1	FV/FV	U1/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 370-570 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionym ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV).

							negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (poprawa oceny parametru z U1 na FV)
80	A182 Mewa siwa <i>Larus canus</i>	w	U2/U2	FV/FV	U1/U1	U2/U2	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U2. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 2200-6900 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U2). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionym ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).

81	A184 Mewa srebrzysta <i>Larus argentatus</i>	c	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płyctzyny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 3400-4700 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionym ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płyctzyny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV)
82	A184 Mewa srebrzysta <i>Larus argentatus</i>	w	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 5000-9400 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

							dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionym ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV)
83	A187 Mewa siodłata <i>Larus marinus</i>	c	FV/FV	FV/FV	FV/FV	FV/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 220-300 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla

							kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionym ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV)
84	A187 Mewa siodłata <i>Larus marinus</i>	w	U2/U2	FV/FV	U1/U1	U2/U2	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV - obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) zróżnicowanie żerowisk obejmujących: środowiska morskie (pelagiczne), płycizny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie,	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U2. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 250-400 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U2). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępnym dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionym ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV),

							plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000): ocena FV - obecne są co najmniej 3 typy środowisk żerowiskowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	b) obecne są zróżnicowane żerowiska obejmujące: środowiska morskie (pelagiczne), pływiczny i strefa przybrzeżna (eulitoral /litoral), porty i przystanie rybackie, plaże, obszary rolnicze, składowiska odpadów (poza obszarem Natura 2000) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1).
85	A191 Rybitwa czubata <i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) miejsca odpoczynku: ocena FV - obecność >2 hektarów siedlisk naturalnych (piaszczystych łach i wysp) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochny, sztuczne wyspy) niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania, b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 80-330 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) siedliska naturalne (piaszczyste łachy i wyspy) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochny, sztuczne wyspy) będące miejscem odpoczynku ptaków, niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania zajmują >2 hektary powierzchni (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych

							w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	(utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
86	A193 Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	c	FV/FV	U1/U1	FV/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) miejsca odpoczynku: ocena FV - obecność >2 hektarów siedlisk naturalnych (piaszczystych łach i wysp) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochrony, sztuczne wyspy) niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania, b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 200-280 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) siedliska naturalne (piaszczyste łachy i wyspy) i/lub pochodzenia antropogenicznego (falochrony, sztuczne wyspy) będące miejscem odpoczynku ptaków, niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania zajmują >2 hektary powierzchni (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).

87	A197 Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	c	FV/FV	U1/FV	FV/FV	U1/FV	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost; Siedlisko: a) obecność piaszczystych łąch będących miejscem odpoczynku niedostępnych dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesionych ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania: ocena FV – obecność przynajmniej dwóch siedlisk piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda, b) średnia biomasa larw owadów wodnych (głównie z rodziny <i>Chironomidae</i>) na stacjach monitoringu: ocena FV - rosnący, stabilny lub niewielki spadek (< 20%) względem wartości referencyjnej, c) presja rekreacyjna od maja do września: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U1 na FV. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 1040-1900 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U1 na FV, w tym: a) obecne są przynajmniej dwa siedliska piaszczystej łąchy (lub kompleksu łąch) o powierzchni min. 1 hektara każda będące miejscem odpoczynku niedostępne dla drapieżnych ssaków i na tyle wzniesione ponad poziom wody, by nie były zalewane podczas falowania (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), b) średnia biomasa larw owadów wodnych (głównie z rodziny <i>Chironomidae</i>) na stacjach monitoringu rosnąca, stabilna lub wykazująca niewielki spadek (< 20%) względem wartości referencyjnej (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV), c) niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
----	---	---	-------	-------	-------	-------	---	---

88	A199 Nurzyk <i>Uria aalge</i>	w	XX/FV	U2/U1	U1/U1	U2/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Poprawa oceny stanu ochrony gatunku z U2 na U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 240-620 osobników (poprawa oceny parametru z XX na FV). Siedlisko: poprawa oceny parametru z U2 na U1, w tym: a) przytów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1), b) Niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U2 na U1).
89	A200 Alka <i>Alca torda</i>	w	XX/FV	U1/U1	U1/FV	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT),	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 450-1600 osobników (poprawa oceny parametru z XX na U1). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przytów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego

							b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (poprawa oceny parametru z U1 na FV).
90	A202 Nurnik <i>Cephus grylle</i>	w	FV/FV	U1/U1	U1/U1	U1/U1	Populacja: ocena FV - populacja stabilna lub wykazująca wzrost. Siedlisko: a) udział ptaków złapanych przypadkowo podczas połowów gatunków użytkowych: ocena FV - przytów na poziomie nieprzekraczającym 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników (BLT), b) presja rekreacyjna od października do kwietnia: ocena FV - niska presja rekreacyjna lub jej brak na >50% punktów monitoringowych. Szanse zachowania: ocena FV - brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku; zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.	Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku na poziomie U1. Populacja: utrzymanie populacji na poziomie 10-80 osobników (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV). Siedlisko: utrzymanie oceny parametru na poziomie U1, w tym: a) przytów przekracza 1% naturalnej rocznej śmiertelności dorosłych osobników, lecz nie przekracza biologicznie dopuszczalnego progu dodatkowej śmiertelności (PBR) (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1), b) niska presja rekreacyjna lub jej brak na 21-50% punktów monitoringowych (utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1). Szanse zachowania: zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec

								istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom (utrzymanie oceny parametru na poziomie FV).
--	--	--	--	--	--	--	--	---